



Grandes Cultures

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

BOURGOGNE et FRANCHE-COMTE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n° 2 du 10/02/2000 - 2 pages

Colza

Stade : Repos végétatif

Charançon de la tige (*Ceuthorrhynchus napi*)


Replacer les cuvettes jaunes dès que possible et surveiller l'arrivée des charançons. Les conditions favorables au vol du charançon de la tige peuvent survenir dans les prochains jours ou semaines : elles sont réunies

quand, pendant 2 à 3 jours consécutifs, les températures maximales sont supérieures à 9-10°C, la durée d'ensoleillement d'au moins 3 heures par jour et les précipitations nulles (< 0,5 mm par jour).

L'objectif de la lutte contre le charançon de la tige est la destruction des insectes avant les pontes, soit 8 à 10 jours après le début du vol. Il est donc important de détecter les premières captures. Aucune capture n'a été observée dans les premières cuvettes remises en place.

Utiliser la cuvette jaune et identifier le gros charançon de la tige

- Placer à 10 m de la bordure de la parcelle, près d'un ancien champ de colza.
- Remplir d'eau et de quelques gouttes de mouillant.
- Le fond de la cuvette suit le niveau supérieur de la végétation.
- Réaliser 2 relevés par semaine.



Critères de reconnaissance :

- Long de 2,6 à 4 mm,
- Extrémités des pattes noires,
- Corps gris foncé.



Céréales

Désherbage

Nous observons actuellement des situations bien en rapport avec des semis plutôt précoces suivis par un hiver doux. Les gaillets sont bien présents, les vulpins et les véroniques à feuilles de lierre sont déjà bien développés. Pour les semis précoces non désherbés à l'automne il faudra veiller à intervenir rapidement dès que les conditions climatiques et la portance des sols le permettront.

Les 3 fiches ci-jointes présentent les résultats obtenus dans les essais conduits par le Service de la Protection des Végétaux pour les spécialités suivantes, récemment autorisées :

.AFFINITY, association d'isoproturon et de carfentrazone, commercialisée par Philagro
.TREZOR, nouvelle association d'isoproturon, de diflufenicanil et de bifenox, commercialisée par Rhône Poulenc.

.BIZON, nouvelle association d'isoproturon, de diflufenicanil et de flurtamone, commercialisée par Rhône Poulenc.

Prévenir la résistance des adventices

Depuis plusieurs années se développent des populations de vulpin, ray grass et folle avoine résistantes à certains herbicides. L'apparition de résistances chez les adventices est le plus souvent liée à l'utilisation répétée sur une même parcelle du même herbicide, ou d'herbicides ayant le même mode d'action. Des mécanismes de résistances croisées viennent encore réduire les possibilités d'intervention pour contrôler ces adventices résistantes. Les antigraminées foliaires des familles des aryloxyphénoxypropionates [fops] et, dans une moindre mesure, des cyclohexanediones [dimes] sont les plus concernés. Ces deux familles agissent par inhibition de l'acétyl-coA-carboxylase, enzyme qui participe à la synthèse des lipides.



Phytoma

La revue
Phytoma-la
Défense des
Végétaux
propose un
abonnement à
tarif

préférentiel à
nos abonnés
(295 F au lieu
de 367 F) pour
11 numéros.

Contact :
01.42.61.62.35



Colza

Pensez à remplacer
les cuvettes.

Céréales

Fiches herbicides.

Pois

Fiche technique des
conseils concernant
la réalisation des
semis et les précau-
tions à prendre.

Service Régional de la
Protection des Végétaux
ZI Nord - BP 177
21205 BEAUNE Cedex
Tél : 03.80.26.35.45
Fax : 03.80.22.63.85

Service Régional de la
Protection des Végétaux
Immeuble Orion
191, Rue de Belfort
25043 BESANCON Cedex
Tél : 03.81.47.75.70
Fax : 03.81.47.75.79

Imprimé à la station
D'Avertissements Agricoles
de Bourgogne
Directeur gérant : JC
RICHARD
Publication périodique
C.P.P.A.P. n°1700 AD
ISSN n°0758-2374

SPV Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre autorisation
©, Tarif Courrier et Fax : 380 F.

D3405043156

7165

Deux types de situations principales peuvent être observées :

- la résistance ne concerne que certaines substances actives ; il s'agit d'un mécanisme de détoxification.
- la résistance est totale et englobe l'ensemble des substances actives ayant le même mode d'action : il s'agit d'une mutation de cible.

Face au risque potentiel de trouver des adventices résistantes dans les parcelles, le groupe ANPP "résistance des mauvaises herbes aux herbicides" a établi, à partir de critères considérés comme influençant l'apparition des résistances aux herbicides, une grille d'appréciation du risque.

Les critères retenus correspondent aux techniques culturales ayant une incidence sur la dynamique d'évolution des graminées adventices et sur la sélection d'individus résistants. Les 4 premiers critères visent à évaluer les pratiques culturales ayant une influence sur l'évolution des populations d'adventices. Les 3 suivants permettent de mesurer la pression de sélection exercée sur la population de mauvaises herbes à partir du mode d'action des graminicides employés dans la rotation.

Si la somme des points obtenue est inférieure à 18, les risques d'apparition d'une résistance sont faibles. Il n'est donc pas nécessaire de modifier la gestion culturale de la parcelle.

Si le total est compris entre 18 et 32, les risques d'apparition d'une résistance sont modérés. La vigilance est de mise et il convient, en particulier, de veiller à alterner les modes d'action herbicides.

Si le nombre de points dépasse 32, les risques sont élevés. La pression des graminées adventices pourra être réduite par :

➤ **Les moyens agronomiques :**

-favorisant l'enfouissement des graines en profondeur (labour),

-en réduisant le stock semencier (déchaumages, techniques du faux-semis,...),

-en introduisant dans la rotation une culture défavorable à la germination de l'adventice visée (culture de printemps pour lutter contre le vulpin,...)

➤ **L'utilisation raisonnée d'herbicides :**

-en utilisant des produits adaptés à la cible et en suivant les recommandations de doses,

- en profitant de la diversité des cultures dans la rotation pour utiliser des produits

de groupes différents, efficaces sur l'adventice considérée.

On peut penser à utiliser une panoplie plus étendue d'herbicides différents afin de mettre en oeuvre de véritables rotations d'herbicides propres à éviter l'apparition de résistants ou d'en maintenir la fréquence à des seuils acceptables. Cependant, d'autres moyens préventifs, tels que le désherbage mécanique ou la nature des cultures en rotation doivent être également employés.

Classification des herbicides (source HRAC)

Famille(s)	Mode d'action par inhibition de :	Produits
Aryloxyphénoxypropionates, Cyclohexanes diones	l'acétyl coA carboxylase	"FOPS" : diclofop, fenoxaprop "DIMES" : cycloxydime
Sulfonylurées, Imidazolinones	l'acétolactase synthase	amidosulfuron, nicosulfuron, metsulfuron Imazaméthabenz
Triazines, Triazinones, Uraciles, Pyridazinones	la photosynthèse (photosystème II)	hexazinone bromacile
Urées substituées	la photosynthèse (photosystème II)	Uron : isoproturon, chlortoluron
Bipyridyliums	la photosynthèse (photosystème I)	diquat, paraquat
Diphényl éthers	la protoporphyrène oxydase	binénox, aclonifen
Glycines	l'ESP synthase	glyphosate, sulfosate
Amino phosphonates	la glutamine synthétase	glufosinate
Dinitroanilines	la formation des microtubules (mitose)	toluidines : trifluraline, pendimethaline
Chloroacétamides, Carbamates, Acétamides, Benzamides	la division cellulaire	alachlore/asulane napropamide, tébutame, isoxaben
Thiocarbamates, Benzofurannes	la synthèse des lipides	éthofumesate, triallate, prosulfocarbe

Grille d'évaluation du risque de résistance aux herbicides chez les graminées hivernales (source ANPP)

Niveau de risque	Faible (1 point)	Moyen (3 points)	Elevé (5 points)
Cultures différentes dans la rotation	> 3	2 ou 3	1
Rapport : cultures hiver (H)/cultures de printemps(P)	H <= P	H > P	P = 0
Travail du sol dans la rotation : Retournement R / Non retournement (NR)	R > ou = NR	NR > R	R = 0
Entretien de l'interculture (déchaumage et faux-semis)	2 fois	Une fois	Non
Nb de modes d'action antigraminées utilisés dans la rotation	> ou = 3	2	1
Nb de campagnes successives avec le même mode d'action antigraminées	Pas de succession	2	> ou = 3
Nb de traitements avec graminicides à même mode d'action au cours de la campagne	1	2	3 ou plus
Niveau de salissement de la parcelle	Faible	Moyen	Fort
Qualité du contrôle de la graminée et évolution sur les 3-4 dernières années	bon constant	moyen fluctuant	insuffisant décroissant

Réabonnement : N'oubliez pas de vous réabonner en utilisant la fiche jointe au dernier bulletin



BIZON

Firme : **RHONE POULENC AGRO FRANCE**

Composition : **diflufénicanil 27 g/l**

flurtamone 67 g/l

isoproturon 400 g/l

Dose d'emploi : **3 l/Ha**

Ce tableau résume les résultats obtenus par le service de la protection des végétaux avec la spécialité **BIZON** dans 8 essais conduits en 1998.

PLANTES ADVENTICES		NOMBRE DE DONNÉES	POPULATION Nombre / m ²	BIZON	QUARTZ GT Réf. CEB
NOM SCIENTIFIQUE	NOM FRANÇAIS				
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Vulpin des champs	6	140		
<i>Avena fatua</i>	Folle avoine	1	15		
<i>Bromus sterilis</i>	Brome stérile	1	197		
<i>Aphanes arvensis</i>	Alchémille des champs	2	10		
<i>Brassica napus</i>	Repousse de colza	1	8		
<i>Capsella bursa pastoris</i>	Capselle bourse Pasteur	1	9		
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	5	28		
<i>Lamium amplexicaule</i>	Lamier amplexicaule	1	5		
<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre	1	8		
<i>Matricaria chamomilla</i>	Matricaire camomille	1	11		
<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	2	10		
<i>Poa annua</i>	Paturin annuel	1	44		
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Ravenelle	1	5		
<i>Stellaria media</i>	Stellaire	2	13		
<i>Veronica agrestis</i>	Véronique agreste	1	19		
<i>Veronica hederifolia</i>	Véronique f de lierre	3	35		
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	4	15		
<i>Viola arvensis</i>	Pensée des champs	2	25		

Légende : efficacité

70 à 85 %
85 à 95 %
> 95 %

P166

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945

1944-1945



TREZOR

Firme : **RHONE POULENC AGRO FRANCE**

Composition : **diflufénicanil 26.7 g/l**
bifenox 150 g/l
isoproturon 333.3 g/l

Dose d'emploi : **4.5 l/Ha**

Ce tableau résume les résultats obtenus par le service de la protection des végétaux avec la spécialité **Trezor** dans 16 essais conduits en 1997 et 1998.

PLANTES ADVENTICES		NOMBRE DE DONNÉES	POPULATION Nombre / m ²	TREZOR	QUARTZ GT Réf. CEB
NOM SCIENTIFIQUE	NOM FRANÇAIS				
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Vulpin des champs	10	110		
<i>Avena fatua</i>	Folle avoine	1	15		
<i>Lolium multiflorum</i>	Ray grass	1	25		
<i>Poa annua</i>	Paturin annuel	2	40		
<i>Poa trivialis</i>	Paturin commun	1	12		
<i>Aethusa cynapium</i>	Ethuse (Petite cigue)	1	6		
<i>Anagalis arvensis</i>	Mouron rouge	1	32		
<i>Aphanes arvensis</i>	Alchémille des champs	2	25		
<i>Arabidopsis thaliana</i>	Arabette de thalius	1	2		
<i>Brassica napus</i>	Repousses de Colza	1	8		
<i>Capsella bursa pastoris</i>	Capselle bourse Pasteur	5	16		
<i>Centaurea cyanus</i>	Bleuet	1	5		
<i>Chenopodium album</i>	Chénopode blanc	1	3		
<i>Chenopodium polyspermum</i>	Chénopode polysperme	1	5		
<i>Fumaria officinalis</i>	Fumeterre officinale	1	10		
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	9	20		
<i>Geranium sp</i>	Géranium sp	1	10		
<i>Juncus bufonius</i>	Jones des Crapauds	1	70		
<i>Lapsana communis</i>	Lampsane commune	1	9		
<i>Lamium purpureum</i>	Lamier pourpre	2	14		
<i>legousia speculum veneris</i>	Peigne de Vénus	1	41		
<i>Lithospermum arvense</i>	Grémil des champs	1	20		
<i>Matricaria chamomilla</i>	Matricaire camomille	5	7		
<i>Myosotis arvensis</i>	Myosotis arvensis	2	15		
<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	6	42		
<i>Polygonum aviculare</i>	Renouée des oiseaux	1	58		
<i>Senecio vulgaris</i>	Seneccon commun	1	8		
<i>Stellaria media</i>	Stellaire	7	52		
<i>Veronica hederifolia</i>	Véronique f de lierre	6	45		
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	4	74		
<i>Viola arvensis</i>	Pensée des champs	5	45		

Légende : efficacité

70 à 85 %
85 à 95 %
> 95 %

7167



AFFINITY

Firme : **PHILAGRO FRANCE**

Composition : **carfentrazone 7.5 g/kg**
isoproturon 500 g/kg

Dose d'emploi : **2.750 kg/ha**

Ce tableau résume les résultats obtenus par le service de la protection des végétaux avec la spécialité **AFFINITY** dans 19 essais conduits en 1994 et 1995.

PLANTES ADVENTICES		NOMBRE DE DONNÉES	POPULATION Nombre / m ²	AFFINITY	QUARTZ GT Réf. CEB
NOM SCIENTIFIQUE	NOM COMMUN				
<i>Anagalis arvensis</i>	Mouron rouge	1	12		
<i>Brassica napus</i>	Repousses de colza	2	9		
<i>Fumaria officinalis</i>	Fumeterre officinale	1	11		
<i>Galium aparine</i>	Gaillet gratteron	14	38		
<i>Geranium sp</i>	Géranium sp	1	12		
<i>Lapsana communis</i>	Lampsane commune	2	14		
<i>Lamium amplexicaule</i>	Lamier amplexicaule	1	60		
<i>Matricaria chamomilla</i>	Matricaire camomille	2	14		
<i>Matricaria inodora</i>	Matricaire inodore	1	59		
<i>Mercurialis annua</i>	Mercuriale annuelle	2	20		
<i>Papaver rhoeas</i>	Coquelicot	5	78		
<i>Ranunculus sp</i>	Renoncule sp	1	4		
<i>Sinapis arvensis</i>	Moutarde des champs	3	8		
<i>Stellaria media</i>	Stellaire intermédiaire	4	18		
<i>Sonchus arvensis</i>	Laiteron des champs	1	5		
<i>Trifolium repens</i>	Tréfle rampant	1	10		
<i>Veronica arvensis</i>	Véronique des champs	3	17		
<i>Veronica hederifolia</i>	Véronique f de lierre	7	15		
<i>Veronica persica</i>	Véronique de Perse	1	7		
<i>Viola arvensis</i>	Pensée des champs	3	19		
<i>Alopecurus myosuroides</i>	Vulpin des champs	6	118		
<i>Avena fatua</i>	Folle avoine	4	78		
<i>Lolium multiflorum</i>	Ray grass	2	187		
<i>Poa annua</i>	Paturin annuel	1	12		

Légende : efficacité

70 à 85 %
85 à 95 %
> 95 %

Les Bonnes Pratiques Agricoles de semis de pois.



Le succès d'une culture de pois dépend en premier lieu de sa bonne implantation et de sa bonne protection contre les agressions des parasites externes (maladies et insectes). Le traitement des semences répond parfaitement à cet objectif. Ce traitement très localisé, apporte des quantités limitées de matières actives à l'hectare. Il est toutefois nécessaire de respecter les bonnes pratiques agricoles car une bonne protection des semences est toujours réalisée avec un produit phytosanitaire. ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Bien raisonner ○ ○ ○

● ● La densité du semis

Elle fluctue selon le PMG et le peuplement recherché (variable selon les types de terre et la protection des semences).

L'optimum se situe aux environs de 60 à 80 grains/m²

Plus efficace sera la protection, plus la population recherchée sera proche de la densité de semis ; une bonne protection permet ainsi d'optimiser l'investissement en semences.

● ● La profondeur du semis

L'optimum est de 4 cm

Elle permet :

- ✓ d'améliorer l'implantation de la culture.
- ✓ de limiter les prélèvements par les oiseaux.
- ✓ de maximiser l'efficacité anti thrips des traitements de semences.


● ● La date de semis

Semer dans un sol suffisamment réchauffé et ressuyé.

Important :

- ✓ limiter au maximum les stress hydriques et thermiques
- ✓ la qualité de la structure du sol influe fortement sur la production de rhizobium (azote)

Un pois ne se sème pas comme un blé



Prendre des précautions

• • Au moment du semis

■ **Bien enfouir les semences** pour éviter qu'elles soient consommées par les oiseaux et faciliter une bonne germination.



Ne pas laisser des tas de semences sur le sol qui peuvent attirer le gibier ou les animaux domestiques, même lors d'un déversement accidentel.



■ Préconisations :

- Ne pas utiliser de semences de pois traitées PROMET® CS400 dans les sols ayant plus de 30 % de mottes (souvent lié à une mauvaise préparation du sol) ou de cailloux d'un diamètre supérieur à 5 cm.

- Veillez à un bon enfouissement des semences dans les zones difficiles (fourrières, passages de roues).
- Dans les situations sans labour, il faudra veiller à un bon enfouissement des résidus végétaux.

Comme pour toute manipulation de produits phytosanitaires, porter des vêtements de protection individuelle pendant le semis.



Porter des gants lors du remplissage du semoir et éviter tout contact avec le produit.